# МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1516 от « 14 » июня 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агрорус и Ко», ОГРН 1037739582825;

Левей Маркетинг Актиенгезелльшафт

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Гренч, СП (600 г/кг метсульфурон-метила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 184(040)-03-1516-1

на срок по « 13 » июня 2027 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

(подпись)

М. П.

№ 001720

© ЗАО «Первый печатный двор». г. Москва. 2015 г. Уровень «Б»

**Для сельскохозяйственного производства:**

| Норма применения препарата (кг/га) | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,008-0,010 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) |
| 0,008-0,010 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только зерновые. | 60(1) |

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Гренч, СП (600 г/кг метсульфурон-метила) от 14 июня 2017 г. № 1516

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур.<br>Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | |
| 0,010 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков(2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи; подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) |

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов; в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев